

PROTOCOL DE SALUT

1.- ACTUACIÓ DAVANT DE LA MALALTIA.

Malalties:

En cas que el nen es posi malalt a l'escola s'actuarà segons les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que estableix que s'avisarà la família i es consensuaran les decisions a prendre.

Si fos necessari s'avisarà el servei d'emergències 112.

Reincorporació a l'escola:

. En cas de malalties transmissibles, caldrà seguir els criteris del següent llistat sobre les malalties transmissibles més freqüents i els criteris de no assistència a l'escola.

Febre: Es trucarà a la família. Tingueu en compte que no donarem paracetamol per baixar la febre si aquesta no és igual o superior a 38º. **Si un nen/a marxa amb febre, no podrà venir a l'endemà a l'escola. Mínim 24 hores a casa sense febre.**

Vòmits (amb o sense febre): Poden ser signe d'una infecció. Si el nen/a té malestar general, està incòmode, té nàusees, no es queda tranquil després de vomitar ... Mínim 1 dia a casa en observació.

Diarrea (amb o sense febre): Els primers dies d'una GEA (gastroenteritis aguda) l'infant no es troba bé i té deposicions molt freqüents. És possible que també presenti vòmits i/o febre, però no necessàriament han d'aparèixer aquests símptomes. No podrà assistir a l'escola en mínim 48 hores i només podrà tornar quan faci les deposicions normals.

Varicel·la: El nen/a no pot tornar a l'escola fins que totes les lesions estan en fase crosta. 8 dies a casa, aproximadament.

Escarlatina: Si l'infant es troba bé pot anar a l'escola a les 24 hores d'haver començat el tractament. Mínim 1 dia a casa.

Conjuntivitis: (Quan hi ha secreció lleganyosa és contagiosa). No pot assistir-hi fins que no desapareguin les secrecions. Mínim 1 dia a casa després d'iniciat el tractament.

Tos: Quan un nen/a presenta una bronquitis aguda i requereix tractament amb inhaladors ha d'estar a casa seva per poder rebre una atenció continuada.

Aftes orals: S'ha de consultar el metge per saber si es tracta d'aftes contagioses. En aquest cas el nen/a ha de quedar-se a casa fins el guariment de les lesions.

Polls: Són molt contagiosos i cal aplicar un bon tractament de seguida. Podrà tornar a l'escola quan s'hagi eliminat els ous o llémenes del cabell.

2.- L'ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL.

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, l'escola administrarà com a **únic antitèrmic el PARACETAMOL**, amb unes recomanacions d'ús del medicament.

La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l'organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments.

Davant d'un infant amb febre, l'escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor/a i demanar-li que el reculli. Encara que no es tracti d'una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l'escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Mentrestant, si la febre és **igual o superior a 38°C** es recomana administrar paracetamol (fins l'arribada d'algun familiar que el vingui a recollir) per la seva bona tolerància i la relativa absència d'efectes secundaris.

Per poder administrar aquest medicament cal tenir l'autorització de la família o tutor/a legal. Aquesta autorització la demanarà l'escola en el moment de la matrícula de l'alumne al centre i serà vàlida per tota l'escolaritat.

3.- ADMINISTRACIÓ D'ALTRES MEDICAMENTS ALS ALUMNES.

Seguint les recomanacions del Departament d'Educació cal tenir present les següents indicacions:

. Administrar medicaments és responsabilitat de les famílies. Cal evitar al màxim l'administració durant el temps de permanència a l'escola.

. A l'escola no s'administrarà cap medicació sense recepta mèdica que especifiqui la dosi i l'horari d'administració i la forma de conservació.

. També cal portar signada pel pare/mare/tutor un escrit on es demani i s'autoritzi al personal de l'escola que administri al fill/a la medicació prescrita (**Trobareu el formulari a la pàgina web de l'escola**).

. **No deixeu els medicaments a les motxilles** dels nens/es, doneu-los en mà a les tutores.

. També cal especificar si el medicament s'ha de retornar cada dia a casa o ha de romandre a l'escola. Recordeu que són les famílies les que heu de reclamar la medicació en el moment de la sortida de l'escola.

. Si l'interval d'administració de la medicació és de 8 hores, cal administrar-la abans de portar el nen/a a l'escola i després de recollir-lo.

. L'escola mantindrà en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els escrits d'autorització.